



Solution de piégeage à base de phéromone contre *Planococcus ficus*

Cette solution combine un Delta trap et un diffuseur à base de phéromone sexuelle pour capturer les mâles adultes de la cochenille farineuse de la vigne.

Avantages



Diffusion longue
durée



Formulé avec des Utilisable en ingrédients
biosourcés agriculture biologique



Facile à appliquer



Outil d'aide à
la décision



Spécifique au
ravageur ciblé



Stockage à
température ambiante
(0-30°C)

Caractéristiques de VMB Pro Caps®

*pour une température moyenne de 30°C et sans vent fort.

Type de produit	Diffuseur de phéromones
Packaging	Seringue en polypropylène
Utilisation	Détection / Monitoring
Substance active	Lavandulyl senecioate
Cible	Cochenille farineuse de la vigne (<i>Planococcus ficus</i>)
Poids net de la formulation	0,95 g
Temps indicatif de diffusion*	2 mois
Rayon de diffusion estimé	Cochenilles attirées sur un rayon de 10 m

Utilisation

Période de détection : d'avril à novembre dans l'hémisphère Nord. D'octobre à avril dans l'hémisphère sud. Renouvelez le diffuseur en fonction de la durée indicative de diffusion. Effectuez des relevés de manière hebdomadaire pour suivre la pression du ravageur.

Positionnement des pièges : accrocher aux fils de palissage ou au cep de vigne (ou plante hôte)

Densité recommandée pour le monitoring : 1 piège/ha.
Consultez votre agronome référent pour plus de détails.



Pièges associés




Montage du piège


Exemple d'utilisation de la **seringue VMB Pro Caps®** + Delta trap




Montez le piège Delta



Retirer le film protecteur de la plaque engluée.



Placer la coupelle verte au milieu la plaque engluée. Vider le contenu de la seringue par simple pression sur le piston (inutile de découper l'embout) dans la coupelle.



Insérer la plaque dans le piège avant de le refermer.





Trapping solution based on pheromone against *Planococcus ficus*

This solution combines a Delta trap and a pheromone attractant dispenser to capture the males' adults of the vine mealybug.

Benefits



Long diffusion time



Formulated with bio-based ingredients



Usable in organic farming



Easy to apply



Decision support tool



Species-specific targeting



Storage at room temperature (0-30°C)

Characteristics of VMB Pro Caps®

Product type	Pheromone attractant dispenser
Packaging	Polypropylene syringe
Use	Detection / Monitoring
Active substance	Lavandulyl senecioate
Target	Vine Mealybug (<i>Planococcus ficus</i>)
Net weight of formulation	0,95 g
Indicative diffusion time*	2 months
Estimated diffusion radius	Mealybugs attracted on a radius of 10 m

*at an average temperature of 30°C and without strong wind.

Use

Detection period: from April to November in the Northern hemisphere. From October to April in the Southern hemisphere (adapt and renew the dispenser according to recommended diffusion time).

Trap location: hung on the trellising or on the vine stock (or host plant)

Recommended density for monitoring: **1 trap/ha.**

Consult your reference agronomist for more details.






Associated traps



Trap setup

Example of use of VMB Pro Caps® syringe +



Remove the white grid from the trap. Place the open cup in the trellising and insert the VMB Pro Caps® syringe.

