



Solution de piégeage à base d'attractant alimentaire contre *Bactrocera dorsalis*

Cette solution combine un piège Smart trap® et un diffuseur à base d'attractant alimentaire pour capturer les mâles et les femelles adultes de la mouche orientale des fruits. .

Avantages

Diffusion longue durée	Formulé avec des ingrédients biosourcés	Utilisable en agriculture biologique	Facile à appliquer	Outil d'aide à la décision	Spécifique au ravageur ciblé	Stockage à température ambiante (0-30°C)

Caractéristiques de Bactrocera Pro Drop®

Type de produit	Diffuseur d'attractant alimentaire
Conditionnement	Tube Eppendorf
Usage	Detection / Monitoring et piégeage de masse
Substance active	Methyl eugenol
Cible	mouche orientale des fruits (<i>Bactrocera dorsalis</i>)
Volume de formulation	1,45 g
Durée indicative de diffusion*	4 à 8 semaines
Rayon de diffusion estimé	Mouches attirées sur un rayon d'environ de 10 m

*pour une température moyenne de 30 °C et sans vent fort.

Utilisation

- 🕒 **Période d'émergence** : De la floraison à la récolte de la culture visée, généralement de mai à janvier pour couvrir toutes les cultures (indicatif de la zone EU). Renouveler le diffuseur selon la durée indicative de diffusion. Effectuer des relevés de manière hebdomadaire pour suivre la pression du ravageur.
- 📍 **Positionnement du piège** : Suspendre dans un arbre à 1,5 m du sol.
- 📊 **Densité recommandée pour monitoring** : 3 à 5 pièges/ha.
- 📊 **Densité recommandée pour le piégeage en masse** : 12 à 20 pièges/ha.
- 📖 Consultez votre agronome référent pour plus de détails.



Pièges associés




Montage de piège

Exemple d'utilisation de **Bactrocera Pro Drop® tube** + Smart Trap® (format à l'envers)



Percez des trous dans le bol pour y faire passer la ficelle. Porter des gants. Ouvrir le tube d'attractif. Ne pas toucher le produit avec les mains



Placer le tube (ouverture vers le haut) dans la cage. Fixer la cage dans le bol (supports fournis)



Ajouter de l'eau ou une solution de savon inodore dans la partie inversée (partie verte). Tordre ensemble le bol et l'entonnoir. Suspendre le piège à l'envers. Les mouches mâles et femelles sont attirées, entrent dans le piège et se noient dans l'eau.






Trapping solution based on food attractant against *Bactrocera dorsalis*

This solution combines a Smart trap® and a food attractant diffuser to capture the males and females adults of the Oriental fruit fly.

Benefits



Characteristics of Bactrocera Pro Drop®

Product type	Food attractant dispenser
Packaging	Tube Eppendorf
Use	Detection / Monitoring & Mass trapping
Active substance	Methyl eugenol
Target	The oriental fruit fly (<i>Bactrocera dorsalis</i>)
Volume of formulation	1,45 g
Indicative diffusion time*	4 to 8 weeks
Estimated diffusion radius	Flies attracted on a radius of approximatively 10 m

*pour une température moyenne de 30 °C et sans vent fort.

Use

- 🕒 **Detection period** : From flowering to harvest of the target crop, generally from May to January to cover all crops (indicative for the EU zone). Renew the sprayer according to the indicative spray duration. Take weekly readings to monitor pest pressure and empty the trap if necessary
- 📍 **Trap location** : Hung at about 1.5 m above the ground.
- 🐛 **Recommended density for monitoring** : 3-5 traps/ha
- 🐛 **Recommended density for mass trapping** : 12 to 20 traps/ha.
- 📖 Consult your reference agronomist for more details



Associated traps



Trap setup

Example of use of an **Bactrocera Pro Drop® tube** + Smart Trap® (Upside down format)



Drill holes in the bowl to pass the string through. Wear gloves. Open the tube of attractant. Do not touch the product with your hands



Place the tube (opening upwards) in the cage. Attach the cage in the bowl (supports provided)



Add water or an odorless soap solution in the upside-down (green part). Twist together the bowl and the funnel. Hang the trap in the upside down position. Male and female flies are attracted, enter the trap and drown in the water.

