



Solution de piégeage à base de phéromone contre *Planococcus citri*

Cette solution combine une feuille sticky et un diffuseur à base de phéromone pour capturer les adultes de la cochenille des agrumes.

Avantages



Diffusion longue durée



Formulé avec des ingrédients biosourcés



Utilisable en agriculture biologique



Facile à appliquer



Outil d'aide à la décision



Spécifique au ravageur ciblé



Stockage à température ambiante (0-30°C)

Caractéristiques de Citri Pro Caps®

Type de produit	Diffuseur de phéromone
Packaging	Seringue en polypropylène
Utilisation	Détection / Monitoring & piégeage de masse
Substance active	Cis-planococcyl acetate
Cible	Cochenille des agrumes (<i>Planococcus citri</i>)
Poids net de la formulation	0,45 g
Temps indicatif de diffusion*	2 mois
Rayon de diffusion estimé	Cochenilles attirées sur un rayon d'environ 10 m


*pour une température moyenne de 30°C et sans vent fort.

Utilisation

- 🕒 **Période d'émergence** : d'avril à octobre (à titre indicatif pour la zone UE). Renouvelez le diffuseur en fonction de la durée indicative de diffusion. Effectuez des relevés de manière hebdomadaire pour suivre la pression du ravageur.
- 📍 **Positionnement du piège** : Suspendre dans/ou au-dessus de la culture.
- 📊 **Densité recommandée pour du monitoring** : 1 piège/ha.
- 📖 Consultez votre agronome référent pour plus de détails.




Pièges associés



Montage du piège

Exemple d'utilisation de Citri Pro Caps® + Sticky trap (Jaune).



Décoller le film du sticky. Placer la coupelle verte au milieu du sticky. Vider le contenu de la seringue par une simple pression sur le piston (inutile de découper l'embout), dans la coupelle. Les cochenilles mâles attirées par la phéromone sexuelle viennent se coller au sticky.






Trapping solution based on pheromone against *Planococcus citri*

This solution combines a sticky and a sexual pheromone attractant dispenser to capture the adults of the citrus mealybug.

Benefits



Characteristics of Citri Pro Caps®

Product type	Sex-pheromone attractant
Packaging	Polypropylene syringe
Use	Detection / Monitoring & Mass trapping
Active substance	Cis-planococcyll acetate
Target	Citrus mealybug (<i>Planococcus citri</i>)
Volume of formulation	0,45 g
Indicative diffusion time*	2 months
Estimated diffusion radius	Mealybugs attracted on a radius of 10 m


*at an average temperature of 30°C and without strong wind.

Use

- 🕒 **Detection period:** from April to October (indicative for the EU zone). Renew the dispenser according to the indicative diffusion duration. Take weekly readings to monitor pest pressure and empty the trap if necessary
- 📍 **Trap location:** Hung in/or above the crop plant.
- 👥 **Recommended density for monitoring:** 1 traps/ha
- 📖 Consult your reference agronomist for more details




Associated traps



Trap setup

Example of use of an **Citri Pro Caps® syringe** + Sticky trap (Yellow).



Peel the film off the sticky. Place the green cup in the middle of the sticky. Empty the contents of the syringe into the cup by simply pressing on the plunger (no need to cut off the tip). The male mealybugs will be attracted to the sticky by the sex pheromone.

