



Solution de piégeage à base de phéromone contre *Thaumetopoea pityocampa*

Cette solution combine un Smart Trap® et un diffuseur à base de phéromone sexuelle pour capturer les mâles adultes de la processionnaire du pin.

Avantages



Caractéristiques de Pine T Pro Caps®

Type de produit	Diffuseur de phéromone
Packaging	Seringue en polypropylène
Utilisation	Détection / Monitoring
Substance active	(Z)-13-hexadécen-11-yn-1-yl-acetate
Cible	Processionnaire du pin
Volume de formulation	1 mL
Temps indicatif de diffusion*	4 mois
Rayon de diffusion estimé	Papillons attirés sur un rayon de 5 m

*pour une température moyenne de 30°C et sans vent fort.

Utilisation

- **Période de détection** : de juin à septembre. Renouvelez le diffuseur en fonction de la durée indicative de diffusion. Effectuez des relevés de manière hebdomadaire pour suivre la pression du ravageur.
- **Positionnement du piège** : suspendre dans la canopée de l'arbre (si possible >10m de hauteur).
- **Densité recommandée pour du monitoring** : 4-5 pièges/parcelle forestière. 1 piège/arbre pour les pins isolés.
- Consultez votre agronome référent pour plus de détails.




Piège associé



Montage du piège

Exemple d'utilisation du sachet de Pine T Pro Caps® + Smart Trap® upside down.





Trapping solution based on pheromone against *Thaumetopoea pityocampa*

This solution combines a Smart Trap® and a sexual pheromone attractant dispenser to capture the males' adults of the processionary moth.

Benefits



Long diffusion time



Formulated with bio-based ingredients



Usable in organic farming



Easy to apply



Decision support tool



Species-specific targeting



Storage at room temperature (0-30°C)

Characteristics of Pine T Pro Caps®

Product type	Pheromone attractant dispenser
Packaging	Polypropylene syringe
Use	Detection / Monitoring
Active substance	(Z)-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetate
Target	Processionary moth
Volume of formulation	1 mL
Indicative diffusion time*	4 months
Estimated diffusion radius	Moths attracted on a radius of 5m

*at an average temperature of 30°C and without strong wind.

Use

- **Detection period:** from June to September (adapt and renew the dispenser according to recommended diffusion).
- **Trap location:** hung in the canopy of the tree (if possible >10m height).
- **Recommended density for monitoring:** 4-5 traps/forest plot. 1 trap/tree for isolated pine trees.
- Consult your reference agronomist for more details.



Pine T Pro Caps®

Associated trap



Smart Trap®
Recommended

Trap setup

Example of use of **Pine T Pro Caps® pouch** + Smart Trap® upside down.

