



Solution de piégeage basée sur un attractant alimentaire contre *Frankliniella occidentalis*

Cette solution combine un piège Sticky et un diffuseur à base d'attractant alimentaire pour capturer les mâles et les femelles adultes du thrips Californien.

Avantages



Long diffusion time



Formulated with bio-based ingredients



Usable in organic farming



Easy to apply



Decision support tool



Species-specific targeting



Storage at room temperature (0-30°C)

Caractéristiques de Frankliniella Pro Caps®

Type de produit	Diffuseur d'attractant alimentaire
Conditionnement	Polypropylene seringue
Usage	Détection / Monitoring et piégeage de masse
Substance active	Beta-caryophyllene, Caryophyllene-oxide
Cible	Thrips Californien (<i>Frankliniella occidentalis</i>)
Volume de formulation	0,95 g
Durée indicative de diffusion*	3 mois
Rayon estimé de diffusion	Thrips attirés sur un rayon d'environ de 10 m

* pour une température moyenne de 30 °C et sans vent fort.

Utilisation

- ⊖ **Période de détection** : D'avril à octobre environ pour les cultures de plein champ ; toute l'année sous serre (penser à renouveler le diffuseur selon la durée indicative de diffusion).
- ⊖ **Positionnement du piège** : Suspendre à environ 10 cm au-dessus de la culture (maraîchage) ou bien dans la zone des fruits de l'arbre (arboriculture).
- ⊖ **Densité recommandée pour le monitoring** : 15 pièges/ha
- ⊖ **Densité recommandée pour le piégeage en masse** : 1 piège tous les 10 mètres
- ⊖ Consultez votre agronome de référence pour plus de détails.




Pièges associés



Montage de piège

Exemple d'utilisation de **Frankliniella Pro Caps®** + Sticky trap (*Bleu*)



Décoller le film de la plaque adhésive. Placer la coupelle au milieu de la plaque et y verser le contenu de la seringue par simple pression sur le piston (inutile de découper l'embout). Les thrips attirés par l'attractant alimentaire viennent se coller au piège adhésif.

Consulter notre catalogue complet

M2i Biocontrol, 112 bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud cedex RCS Nanterre 801069428 - N° Certiphyto : 9200007 - contact@m2i-biocontrol.com - www.m2i-group.fr





Trapping solution based on food attractant against *Frankliniella occidentalis*

This solution combines a Sticky trap and a food attractant dispenser to capture the males and females' adults of the Western Californian thrips.

Benefits



Long diffusion time



Formulated with bio-based ingredients



Usable in organic farming



Easy to apply



Decision support tool



Species-specific targeting



Storage at room temperature (0-30°C)

Characteristics of Frankliniella Pro Caps®

Product type	Food attractant dispenser
Packaging	Polypropylene syringe
Use	Detection / Monitoring & Mass trapping
Active substance	β-caryophyllene, Caryophyllene-oxide
Target	Western Californian thrips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)
Volume of formulation	0,95 g
Indicative diffusion time*	3 months
Estimated diffusion radius	Thrips attracted on a radius of approximatively 10 m

* at an average temperature of 30 °C and without strong wind.

Use

- 🕒 **Detection period:** from April to October in field-scale crops; throughout the year in greenhouses (adapt and renew the pheromone dispenser according to the recommended diffusion time).
- 📍 **Trap location:** Hung around 10 cm above the crop (market gardening) or in the canopy of the tree (orchards)
- 👥 **Recommended density for monitoring:** 15 traps / ha
- 👥 **Recommended density for mass trapping:** 1 trap every 10m
- 📖 Consult your reference agronomist for more details




Associated traps



Trap setup

Example of use of an **Frankliniella Pro Caps®** + Sticky trap (*Bleu*)



Remove the protective film. Stick the cup in the middle of the adhesive part. Empty the content of the syringe simply by pressing the plunger (no need to cut the tip) into the cup. Thrips are attracted by the food-attractant and are trapped on the adhesive

Trapping solution based on food attractant against *Frankliniella occidentalis* - 13/02/2025

Check out our full catalog

