



Solution de piégeage à base de phéromone contre *Rhynchophorus ferrugineus*

Cette solution combine un piège Pitfall (côté noir) et un diffuseur à base de phéromone d'agrégation pour capturer les mâles et les femelles adultes du charançon rouge du palmier.

Avantages



Diffusion longue durée



Formulé avec des ingrédients biosourcés



Utilisable en agriculture biologique



Facile à appliquer



Outil d'aide à la décision



Spécifique au ravageur ciblé



Stockage à température ambiante (0-30°C)

Caractéristiques de Rhyncho Pro Classic®

Type de produit	Diffuseur de phéromone d'agrégation
Conditionnement	Diffuseur à mèche
Usage	Détection / Monitoring et piégeage de masse
Substance active	Ferrugineol
Cible	Charançon rouge du palmier (<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>)
Volume de formulation	36 g
Durée indicative de diffusion*	3 à 4 mois
Rayon estimé de diffusion	Charançons attirés sur un rayon d'environ de 10 m

* pour une température moyenne de 30 °C et sans vent fort.

Utilisation

- ➊ **Période de détection** : de mars à octobre. Renouveler le diffuseur selon la durée indicative de diffusion. Effectuer des relevés de manière hebdomadaire pour suivre la pression du ravageur.
- ➋ **Positionnement du piège** : placer à plus de 10 mètres du palmier, si possible dans une zone ombragée.
- ➌ **Densité recommandée pour le monitoring** : 2 pièges/ha, 1 piège par palmier dans le cas de palmiers isolés
- ➍ **Densité recommandée pour le piégeage en masse** : 7-14 pièges/ha (7 pour les plantations ; 14 en milieu urbain).
- ➎ Consultez votre agronome de référence pour plus de détails.



Pièges associés



Montage de piège

Exemple d'utilisation de Rhyncho Pro Classic® + piège Pitfall (côté noir)



Enterrer la partie inférieure du piège (jaune) et la remplir d'eau jusqu'à mi-hauteur. Mettre des gants. Enlever le capuchon de la bouteille et la visser au centre du volant. Placer le volant horizontalement dans le piège, mèche de la bouteille vers le haut.

Poser la partie supérieure (noire) préalablement enterrée. Les charançons, attirés par la phéromone d'agrégation pénètrent dans le piège et tombent dans l'eau.





Trapping solution based on pheromone against *Rhynchophorus ferrugineus*

This solution combines a Pitfall trap and an aggregation pheromone diffuser to capture adult male and female red palm weevils.

Benefits



Long diffusion time



Formulated with bio-based ingredients



Usable in organic farming



Easy to apply



Decision support tool



Species-specific targeting



Storage at room temperature (0-30°C)

Characteristics of Rhyncho Pro Classic®

Product type	Aggregation pheromone dispenser
Packaging	Bottle
Use	Detection / Monitoring & Mass trapping
Active substance	Ferrugineol
Target	red palm weevils (<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>)
Volume of formulation	36 g
Indicative diffusion time*	3 à 4 months
Estimated diffusion radius	Weevils attracted on a radius of 10 m

* at an average temperature of 30 °C and without strong wind.

Use

- 🕒 **Detection period:** from March to October. Renew according to the recommended diffusion duration. Take weekly readings to monitor pest pressure.
- 📍 **Trap location:** Place more than 10 metres from the palm tree, if possible, in a shady area.
- 📊 **Recommended density for monitoring:** 2 traps/ha, 1 trap per palm in the case of isolated palms
- 📊 **Recommended density for mass trapping:** 7-14 traps/ha (7 for plantations; 14 in urban areas)
- 📖 Consult your reference agronomist for more details.



Associated traps



Trap setup

Example of use of an Rhyncho Pro Classic® + Pitfall trap



Bury the lower part of the trap (yellow) and fill it halfway with water. Put on gloves. Remove the cap from the bottle and screw it onto the centre of the wheel. Place the wheel horizontally in the trap, with the wick of the bottle facing upwards.



Place the upper part (black) in the ground beforehand. The weevils, attracted by the aggregation pheromone, enter the trap and fall into the water.

