



Solution de piégeage à base de phéromone contre *Cosmopolites sordidus*

Cette solution combine un piège Pitfall (côté jaune) et un diffuseur à base de phéromone pour capturer les adultes du charançon du bananier.

Avantages



Diffusion longue durée



Formulé avec des ingrédients biosourcés



Utilisable en agriculture biologique



Facile à appliquer



Outil d'aide à la décision



Spécifique au ravageur ciblé



Stockage à température ambiante (0-30°C)

Caractéristiques de Sordi Pro Classic®

Type de produit	Diffuseur de phéromone
Conditionnement	Diffuseur à mèche
Usage	Détection / Monitoring et piégeage de masse
Substance active	Sordidine
Cible	Charançon du bananier (<i>Cosmopolites sordidus</i>)
Volume de formulation	28 mL
Durée indicative de diffusion*	> 3 mois
Rayon estimé de diffusion	Charançons attirés sur un rayon d'environ de 15 m

* pour une température moyenne de 30 °C et sans vent fort.

Utilisation

- 🕒 **Période de détection** : toute l'année (penser à renouveler le diffuseur de phéromone selon la durée indicative de diffusion).
- 📍 **Positionnement du piège** : dans la bananeraie, si possible dans une zone ombragée. Espacement conseillé de 20 mètres minimum entre les pièges.
- 📊 **Densité recommandée pour le monitoring** : 2 - 3 pièges/ha
- 📊 **Densité recommandée pour le piégeage en masse** : 9-16 pièges/ha.
- 📖 Consultez votre agronome de référence pour plus de détails.



Pièges associés



Montage de piège

Exemple d'utilisation de **Sordi Pro Classic®** + piège Pitfall (côté jaune)



Enterrer la partie inférieure du piège (noire) et la remplir d'eau jusqu'à mi-hauteur. Mettre des gants. Enlever le capuchon de la bouteille et la visser au centre du volant. Placer le volant horizontalement dans le piège, mèche de la bouteille vers le haut. Poser la partie supérieure (jaune) préalablement enterrée. Les charançons, attirés par la phéromone d'agrégation pénètrent dans le piège et tombent dans l'eau

Consulter notre catalogue complet

M2i Biocontrol, 112 bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud cedex RCS Nanterre 801069428 - N° Certiphyto : 9200007 - contact@m2i-biocontrol.com - www.m2i-group.fr





Trapping solution based on pheromone against *Cosmopolites sordidus*

This solution combines a Pitfall trap and a pheromone diffuser to capture adults of Banana weevils.

Benefits



Long diffusion time



Formulated with bio-based ingredients



Usable in organic farming



Easy to apply



Decision support tool



Species-specific targeting



Storage at room temperature (0-30°C)

Characteristics of Sordi Pro Classic®

Product type	pheromone dispenser
Packaging	Bottle
Use	Detection / Monitoring & Mass trapping
Active substance	Sordidin
Target	Banana weevils (<i>Cosmopolites sordidus</i>)
Volume of formulation	28mL
Indicative diffusion time*	> 3 months
Estimated diffusion radius	Weevils attracted on a radius of 15 m

* at an average temperature of 30 °C and without strong wind.

Use

- 🕒 **Detection period:** throughout the year (adapt and renew the pheromone dispenser according to the recommended diffusion time).
- 📍 **Trap location:** in the banana plantation, if possible in a shaded area. M2i recommends a minimum distance of 20 meters between the traps.
- 📊 **Recommended density for monitoring :** 2- 3 traps/ha
- 📊 **Recommended density for mass trapping :** 9-16 traps/ha
- 📖 Consult your reference agronomist for more details.



Associated traps



Trap setup

Example of use of an **Sordi Pro Classic®** + Pitfall trap



Bury the lower part of the trap (Black) and fill it halfway with water. Put on gloves. Remove the cap from the bottle and screw it onto the centre of the wheel. Place the wheel horizontally in the trap, with the wick of the bottle facing upwards. Place the upper part (Yellow) in the ground beforehand. The weevils, attracted by the aggregation pheromone, enter the trap and fall into the water.

