Dispar Pro Caps®



Solution de monitoring à base de phéromones contre *Lymantria dispar*

Cette solution combine un piège Smart trap® et un diffuseur à base de phéromone pour capturer les adultes du *Bombyx Disparate.*

Avantages

- Diffusion longue durée
- Formulé avec des ingrédients biosourcés
- Utilisable en agriculture biologique
- Facile à appliquer
- Outil d'aide à la décision
- Spécifique au ravageur ciblé
- Stockage à température ambiante (0-30°C)

Caractéristiques de Dispar Pro Caps®

Type de produit	Diffuseur de phéromones
Conditionnement	seringue en propylène
Usage	Détection / Monitoring
Substance active	Disparlure racémique
Cible	Bombyx Disparate (*Lymantria dispar*)
Volume de formulation	0,5 mL
Durée indicative de diffusion*	3 mois
Rayon estimé de diffusion	Papillons attirés sur un rayon d'environ de 2 à 5 m

** pour une température moyenne de 30 °C et sans vent fort.*

Utilisation

- **Période de détection :** de Juin à Août.
- **Positionnement du piège :** suspendu le plus haut possible dans la canopée de l'arbre (s'aider d'une cordelette lestée pour mettre en place le piège).
- **Densité recommandée pour le monitoring :** : 4 à 5 pièges/parcelle de forêt (1 à chaque angle et 1 au milieu) ; 1 piège/arbre isolé.
- Consultez votre agronome de référence pour plus de détails.



Pièges associés



Montage de piège

Exemple d'utilisation de **Dispar Pro Caps®** + Smart Trap®



Déposez une goutte au fond du bol en appuyant simplement sur le piston (il n'est pas nécessaire de couper la pointe).

Vide le reste du contenu de la seringue dans la cage et la referme.

Veillez à ce que la cage soit placée dans le trou prévu à cet effet dans le toit du piège.

Les papillons sont attirés par le piège

Consulter notre catalogue complet

M2i Biocontrol, 112 bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud cedex RCS Nanterre 801069428 - N° Certiphyto : 9200007 - contact@m2i-biocontrol.com - www.m2i-group.fr

Dispar Pro Caps®



Monitoring solution based on pheromone against *Lymantria dispar*

This solution combines a Smart trap® and a pheromone attractant dispenser to capture Gypsy moth adults.

Benefits

- Long diffusion time
- Formulated with bio-based ingredients
- Usable in organic farming
- Easy to apply
- Decision support tool
- Species-specific targeting
- Storage at room temperature (0-30°C)

Characteristics of Dispar Pro Caps ®

Product type	Food attractant dispenser
Packaging	Polypropylene syringue
Use	Detection / Monitoring
Active substance	Racemic disparlure
Target	Gypsy moth (*Lymantria dispar*)
Volume of formulation	0,5 mL
Indicative diffusion time*	3 months
Estimated diffusion radius	Moths attracted on a radius of approximatively of 5 m

** at an average temperature of 30 °C and without strong wind.*

Use

- **Detection period :** from June to August.
- **Trap location :** hung as high as possible in the tree's canopy. Use a weighted string to set up the trap.
- **Recommended density for monitoring :** 4-5 traps/forest plot (1 in each side and 1 in the middle); 1 trap/isolated tree.
- Consult your reference agronomist for more details



Associated traps



Trap setup

Example of use of an **Dispar Pro Caps ®** + Smart Trap®



Déposez une goutte au fond du bol en appuyant simplement sur le piston (il n'est pas nécessaire de couper la pointe).

Vide le reste du contenu de la seringue dans la cage et la referme.

Veillez à ce que la cage soit placée dans le trou prévu à cet effet dans le toit du piège.

Les papillons mâles sont attirés par le piège

Check out our full catalog

M2i Biocontrol, 112 bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud cedex RCS Nanterre 801069428 - N° Certiphyto : 9200007 - contact@m2i-biocontrol.com - www.m2i-group.fr