Exigua Pro Caps®



Trapping solution based on pheromone against *Spodoptera exigua*

This solution combines a Delta trap and a sexual pheromone attractant dispenser to capture the males' adults of the beet armyworm.

Benefits

- Long diffusion time
- Formulated with bio-based ingredients
- Usable in organic farming
- Easy to apply
- Decision support tool
- Species-specific targeting
- Storage at room temperature (0-30°C)

Characteristics of Exigua Pro Caps®

Product type	Pheromone-attractant dispenser
Packaging	Polypropylene syringe
Use	Detection / Monitoring
Active substance	(Z,E)-9,12-tetradecadienyl acetate ; (Z)-9-tetradecel-1-ol ; (Z)-11-hexadecenyl acetate.
Target	Beet armyworm (*Spodoptera exigua*)
Volume of formulation	0,5 mL
Indicative diffusion time*	2 months

**at an average temperature of 30°C and without strong wind.*

Use

- **Detection period:** from sowing to harvest depending on the crop and climatic conditions. Renew the dispenser according to the indicative diffusion time. Conduct weekly the traps to monitor pest pressure.
- **Trap location:** in the middle of the crop, hung on a pole about 1,5m above the ground; 20cm above the crop in case of small size plants.
- **Recommended density for monitoring:** 2-6 traps/ha.
- Consult your reference agronomist for more details




Associated traps





Trap setup

Example of use of **Exigua Pro Caps® syringe** + Delta trap



Mount the Delta Trap.

Remove the protective film from the glue plate.

Place the green cup in the middle of the plate and empty the syringe contents into the cup by simply pressing the plunger (no need to cut the tip).

Insert the plate into the trap before closing it.

Check out our full catalog

M2i Biocontrol, 112 bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud cedex RCS Nanterre 801069428 - N° Certiphyto : 9200007 - contact@m2i-biocontrol.com - www.m2i-group.fr

Exigua Pro Caps®



Solution de piégeage à base de phéromone contre *Spodoptera exigua*

Cette solution combine un piège Delta et un diffuseur à base de phéromone sexuelle pour capturer les mâles adultes de la noctuelle de la betterave.

Avantages

- Diffusion longue durée
- Formulé avec des ingrédients biosourcés
- Utilisable en agriculture biologique
- Facile à appliquer
- Outil d'aide à la décision
- Spécifique au ravageur ciblé
- Stockage à température ambiante (0-30°C)

Caractéristiques de Exigua Pro Caps®

Type de produit	Diffuseur de phéromone
Packaging	Seringue en polypropylène
Utilisation	Détection / Monitoring
Substance active	(Z,E)-9,12-tetradecadienyl acetate ; (Z)-9-tetradecel-1-ol ; (Z)-11-hexadecenyl acetate
Cible	Noctuelle de la betterave (*Spodoptera exigua*)
Volume de la formulation	0,5 mL
Temps indicatif de diffusion*	2 mois

**pour une température moyenne de 30°C et sans vent fort.*

Utilisation

- **Période de détection :** d'avril à septembre. Renouvelez le diffuseur en fonction de la durée indicative de diffusion. Effectuez des relevés de manière hebdomadaire pour suivre la pression du ravageur.
- **Positionnement des pièges :** semi-enterré au milieu des rangs.
- **Densité recommandée pour du monitoring :** 2 pièges/ha.
- Consultez votre agronome référent pour plus de détails.




Pièges associés





Montage du piège

Exemple d'utilisation de la seringue **Exigua Pro Caps®** + Delta trap



Montez le piège Delta

Retirer le film protecteur de la plaque engluée.

Placer la coupelle verte au milieu la plaque engluée. Vider le contenu de la seringue par simple pression sur le piston (inutile de découper l'embout) dans la coupelle.

Insérer la plaque dans le piège avant de le refermer.

Consultez notre catalogue complet

M2i Biocontrol, 112 bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud cedex RCS Nanterre 801069428 - N° Certiphyto : 9200007 - contact@m2i-biocontrol.com - www.m2i-group.fr