Fovealis Pro Caps®

Solution de piégeage à base de phéromone contre *Duponchelia fovealis*

Cette solution combine un Delta trap et un diffuseur à base de phéromone sexuelle pour capturer les mâles adultes de la pyrale du cyclamen.

Avantages

- Diffusion longue durée
- Formulé avec des ingrédients biosourcés
- Utilisable en agriculture biologique
- Facile à appliquer
- Outil d'aide à la décision
- Spécifique au ravageur ciblé
- Stockage à température ambiante (0-30°C)

Caractéristiques de Fovealis Pro Caps®

Type de produit	Diffuseur de phéromone
Packaging	Seringue en polypropylène
Utilisation	Détection / Monitoring
Substance active	Z13-octadecenal, E13-octadecenal
Cible	Pyrale du cyclamen (*Duponchelia fovealis*)
Dose de la substance active minimum	0.45g
Temps indicatif de diffusion*	2 mois
Rayon de diffusion estimé	Papillons attirés sur un rayon de 2 à 5 m

**pour une température moyenne de 30°C et sans vent fort.*

Utilisation

- **Période de détection :** de mars à septembre en plein champ. Renouvelez le diffuseur en fonction de la durée indicative de diffusion. Effectuez des relevés de manière hebdomadaire pour suivre la pression du ravageur.
- **Positionnement des pièges :** suspendu à environ 10 cm au-dessus des plantes.
- **Densité recommandée pour le monitoring :** 1 pièges/500 m².
- Consultez votre agronome référent pour plus de détails.




Pièges associés



Montage du piège

Exemple d'utilisation de la **seringue Fovealis Pro Caps®** + Delta trap



Montez le piège Delta

Retirer le film protecteur de la plaque engluée.

Placer la coupelle verte au milieu la plaque engluée. Vider le contenu de la seringue par simple pression sur le piston (inutile de découper l'embout) dans la coupelle.

Insérer la plaque dans le piège avant de le refermer.

Consultez notre catalogue complet

M2i Biocontrol, 112 bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud cedex RCS Nanterre 801069428 - N° Certiphyto : 9200007 - contact@m2i-biocontrol.com - www.m2i-group.fr

Fovealis Pro Caps®

Trapping solution based on pheromone against *Duponchelia fovealis*

This solution combines a Delta trap and a sexual pheromone attractant dispenser to capture the males' adults of the European pepper moth.

Benefits

- Long diffusion time
- Formulated with bio-based ingredients
- Usable in organic farming
- Easy to apply
- Decision support tool
- Species-specific targeting
- Storage at room temperature (0-30°C)

Characteristics of Fovealis Pro Caps®

Product type	Pheromone-attractant dispenser
Packaging	Polypropylene syringe
Use	Detection / Monitoring
Active substance	E13-octadecenal; Z13-octadecenal
Target	(*Duponchelia fovealis*)
Volume of formulation	0.45g
Indicative diffusion time*	2 months
Estimated diffusion radius	Moths attracted on a radius of approx. 2 to 5 m

**at an average temperature of 30°C and without strong wind.*

Use

- **Detection period:** from March to September. Renew the dispenser according to the indicative diffusion time. Conduct weekly the traps to monitor pest pressure.
- **Trap location:** Hung about 10 cm above the plants.
- **Recommended density for monitoring:** 1 traps/500 m².
- Consult your reference agronomist for more details




Associated traps



Trap setup

Example of use of **Fovealis Pro Caps® syringe** + Delta trap



Mount the Delta Trap

Remove the protective film from the glue plate

Place the green cup in the middle of the plate and empty the syringe contents into the cup by simply pressing the plunger (no need to cut the tip).

Insert the plate into the trap before closing it

Check out our full catalog

M2i Biocontrol, 112 bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud cedex RCS Nanterre 801069428 - N° Certiphyto : 9200007 - contact@m2i-biocontrol.com - www.m2i-group.fr