Oak T Pro Caps®



Solution de monitoring à base de phéromones contre *Thaumetopoea processionea*

Cette solution combine un piège Smart trap® et un diffuseur à base de phéromone pour capturer les adultes du processionnaire du chêne.

Avantages

- Diffusion longue durée
- Formulé avec des ingrédients biosourcés
- Utilisable en agriculture biologique
- Facile à appliquer
- Outil d'aide à la décision
- Spécifique au ravageur ciblé
- Stockage à température ambiante (0-30°C)

Caractéristiques de Oak T Pro Caps®

Type de produit	Diffuseur de phéromones
Conditionnement	seringue en propylène
Usage	Détection / Monitoring
Substance active	(Z, Z)-11,13-hexadecadienyl acétate
Cible	Processionnaire du chêne (*Thaumetopoea processionea*)
Volume de formulation	0,5 mL
Durée indicative de diffusion*	3 mois
Rayon estimé de diffusion	Papillons attirés sur un rayon d'environ de 5 m

** pour une température moyenne de 30 °C et sans vent fort.*

Utilisation

- **Période de détection :** de juillet à septembre (penser à renouveler le diffuseur de phéromone selon la durée indicative de diffusion).
- **Positionnement du piège :** suspendu le plus haut possible dans la canopée de l'arbre, de préférence > 10m du sol (s'aider d'une cordelette lestée pour mettre en place le piège).
- **Densité recommandée pour le monitoring :** : 4 à 5 pièges/parcelle de forêt (1 à chaque angle et 1 au milieu) ; 1 piège/arbre dans le cas de chênes isolés
- Consultez votre agronome de référence pour plus de détails.



Pièges associés



Montage de piège

Exemple d'utilisation de **Oak T Pro Caps®** + Smart Trap®



Déposez une goutte au fond du bol en appuyant simplement sur le piston (il n'est pas nécessaire de couper la pointe).

Vide le reste du contenu de la seringue dans la cage et la referme.

Veillez à ce que la cage soit placée dans le trou prévu à cet effet dans le toit du piège.

Les papillons sont attirés par le piège

Consulter notre catalogue complet

M2i Biocontrol, 112 bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud cedex RCS Nanterre 801069428 - N° Certiphyto : 9200007 - contact@m2i-biocontrol.com - www.m2i-group.fr

Oak T Pro Caps®



Monitoring solution based on pheromone against *Thaumetopoea processionea*

This solution combines a Smart trap® and a pheromone attractant dispenser to capture oak processionary moth adults.

Benefits

- Long diffusion time
- Formulated with bio-based ingredients
- Usable in organic farming
- Easy to apply
- Decision support tool
- Species-specific targeting
- Storage at room temperature (0-30°C)

Characteristics of Oak T Pro Caps ®

Product type	Food attractant dispenser
Packaging	Polypropylene syringue
Use	Detection / Monitoring
Active substance	(Z, Z)-11,13-hexadecadienyl acétate
Target	Oak processionary moth (*Thaumetopoea processionea*)
Volume of formulation	0,5 mL
Indicative diffusion time*	3 months
Estimated diffusion radius	Moths attracted on a radius of approximatively of 5 m

** at an average temperature of 30 °C and without strong wind.*

Use

- **Detection period :** from July to September (adapt and renew the pheromone dispenser according to the recommended diffusion time).
- **Trap location :** hung on the tree's canopy (if possible >10m high). Use a weighted string to set up the trap.
- **Recommended density for monitoring :** 4-5 traps/forest plot (1 in each side and 1 in the middle); 1 trap/tree for isolated trees.
- Consult your reference agronomist for more details



Associated traps



Trap setup

Example of use of an **Oak T Pro Caps ®** + Smart Trap®



Déposez une goutte au fond du bol en appuyant simplement sur le piston (il n'est pas nécessaire de couper la pointe).

Vide le reste du contenu de la seringue dans la cage et la referme.

Veillez à ce que la cage soit placée dans le trou prévu à cet effet dans le toit du piège.

Les papillons mâles sont attirés par le piège

Check out our full catalog

M2i Biocontrol, 112 bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud cedex RCS Nanterre 801069428 - N° Certiphyto : 9200007 - contact@m2i-biocontrol.com - www.m2i-group.fr