Ostrinia Pro Caps®

Trapping solution based on pheromone against *Ostrinia nubilalis*

This solution combines a Delta trap and a sexual pheromone attractant dispenser to capture the males' adults of European corn borer.

Benefits

- Long diffusion time
- Formulated with bio-based ingredients
- Usable in organic farming
- Easy to apply
- Decision support tool
- Species-specific targeting
- Storage at room temperature (0-30°C)

Characteristics of Ostrinia Pro Caps®

Product type	Pheromone-attractant dispenser
Packaging	Polypropylene syringe
Use	Detection / Monitoring
Active substance	Z-11 Tetradecenyl acetate; E-11 Tetradecenyl acetate
Target	European corn moth (*Ostrinia nubilalis*)
Minimum dose of active substance	3 mg (0,66%)
Indicative diffusion time*	3 months
Estimated diffusion radius	Moths attracted on a radius of 7 m

**at an average temperature of 30°C and without strong wind.*

Use

- **Detection period:** from May to October. Renew the dispenser according to the indicative diffusion time. Conduct weekly the traps to monitor pest pressure.
- **Trap location:** hung near the crop approximately 1m above the ground.
- **Recommended density for monitoring:** 1-2 traps/ha.
- Consult your reference agronomist for more details




Associated traps





Trap setup

Example of use of **Ostrinia Pro Caps® syringe** + Delta trap



Mount the Delta Trap

Remove the protective film from the glue plate

Place the green cup in the middle of the plate and empty the syringe contents into the cup by simply pressing the plunger (no need to cut the tip).

Insert the plate into the trap before closing it

Check out our full catalog

M2i Biocontrol, 112 bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud cedex RCS Nanterre 801069428 - N° Certiphyto : 9200007 - contact@m2i-biocontrol.com - www.m2i-group.fr

Ostrinia Pro Caps®

Solution de piégeage à base de phéromone contre *Ostrinia nubilalis*

Cette solution combine un Delta trap et un diffuseur à base de phéromone sexuelle pour capturer les mâles adultes de la pyrale du maïs.

Avantages

- Diffusion longue durée
- Formulé avec des ingrédients biosourcés
- Utilisable en agriculture biologique
- Facile à appliquer
- Outil d'aide à la décision
- Spécifique au ravageur ciblé
- Stockage à température ambiante (0-30°C)

Caractéristiques de Ostrinia Pro Caps®

Type de produit	Diffuseur de phéromone
Packaging	Seringue en polypropylène
Utilisation	Détection / Monitoring
Substance active	Z-11 Tetradecenyl acetate; E-11 Tetradecenyl acetate
Cible	Pyrale du maïs (*Ostrinia nubilalis*)
Dose minimum de substance active	3 mg (0,66%)
Temps indicatif de diffusion*	3 mois
Rayon de diffusion estimé	Papillons attirés sur un rayon de 7 m

**pour une température moyenne de 30°C et sans vent fort.*

Utilisation

- **Période de détection :** de mai à septembre. Renouvelez le diffuseur en fonction de la durée indicative de diffusion. Effectuez des relevés de manière hebdomadaire pour suivre la pression du ravageur.
- **Positionnement des pièges :** suspendre près de la culture à environ 1 m du sol.
- **Densité recommandée pour du monitoring :** 1-2 pièges/ha.
- Consultez votre agronome référent pour plus de détails.




Pièges associés





Montage du piège

Exemple d'utilisation de la **seringue Ostrinia Pro Caps®** + Delta trap



Montez le piège Delta → Retirer le film protecteur de la plaque engluée. → Placer la coupelle verte au milieu la plaque engluée. Vider le contenu de la seringue par simple pression sur le piston (inutile de découper l'embout) dans la coupelle. → Insérer la plaque dans le piège avant de le refermer.

Consultez notre catalogue complet

M2i Biocontrol, 112 bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud cedex RCS Nanterre 801069428 - N° Certiphyto : 9200007 - contact@m2i-biocontrol.com - www.m2i-group.fr