Pecti Pro Caps®



Trapping solution based on pheromone against *Pectinophora gossypiella*

This solution combines a Delta trap and a sexual pheromone attractant dispenser to capture the males' adults of the pink bollworm.

Benefits

- Long diffusion time
- Formulated with bio-based ingredients
- Usable in organic farming
- Easy to apply
- Decision support tool
- Species-specific targeting
- Storage at room temperature (0-30°C)

Characteristics of Pecti Pro Caps®

Product type	Pheromone-attractant dispenser
Packaging	Polypropylene syringe
Use	Detection / Monitoring
Active substance	7Z,11Z- & 7Z,11E-Hexadecadienyl acetate
Target	Pink bollworm (*Pectinophora gossypiella*)
Volume of formulation	0,5 mL
Indicative diffusion time*	3 months
Estimated diffusion radius	Moths attracted on a radius of 2 m

**at an average temperature of 30°C and without strong wind.*

Use

- **Detection period:** from May to September. Renew the dispenser according to the indicative diffusion time. Conduct weekly the traps to monitor pest pressure.
- **Trap location:** hung 0,85 m above the ground.
- **Recommended density for monitoring:** 1 trap/ha.
- Consult your reference agronomist for more details.



Pecti Pro Caps®

Associated traps




Delta trap
Recommended



Smart Trap®
Alternative

Trap setup

Example of use of **Pecti Pro Caps® syringe** + Delta trap



Mount the Delta Trap

Remove the protective film from the glue plate

Place the green cup in the middle of the plate and empty the syringe contents into the cup by simply pressing the plunger (no need to cut the tip).

Insert the plate into the trap before closing it

Check out our full catalog

M2i Biocontrol, 112 bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud cedex RCS Nanterre 801069428 - N° Certiphyto : 9200007 - contact@m2i-biocontrol.com - www.m2i-group.fr

Pecti Pro Caps®



Solution de piégeage à base de phéromone contre *Pectinophora gossypiella*

Cette solution combine un Delta trap et un diffuseur à base de phéromone sexuelle pour capturer les mâles adultes du ver rose du cotonnier.

Avantages

- Diffusion longue durée
- Formulé avec des ingrédients biosourcés
- Utilisable en agriculture biologique
- Facile à appliquer
- Outil d'aide à la décision
- Spécifique au ravageur ciblé
- Stockage à température ambiante (0-30°C)

Caractéristiques de Pecti Pro Caps®

Type de produit	Diffuseur de phéromone
Packaging	Seringue en polypropylène
Utilisation	Détection / Monitoring
Substance active	7Z,11Z- & 7Z,11E-Hexadecadienyl acetate
Cible	Ver rose du cotonnier (*Pectinophora gossypiella*)
Volume de formulation	0,5 mL
Temps indicatif de diffusion*	3 mois
Rayon de diffusion estimé	Papillons attirés sur un rayon de 2 m

**pour une température moyenne de 30°C et sans vent fort.*

Utilisation

- **Période de détection :** de mars à septembre en Asie du Sud. Renouvelez le diffuseur en fonction de la durée indicative de diffusion. Effectuez des relevés de manière hebdomadaire pour suivre la pression du ravageur.
- **Positionnement des pièges :** suspendre à 0,85 m du sol.
- **Densité recommandée pour du monitoring :** 1 piège/ha.
- Consultez votre agronome référent pour plus de détails.




Pièges associés





Montage du piège

Exemple d'utilisation de la **seringue Pecti Pro Caps®** + Delta trap



Montez le piège Delta

Retirer le film protecteur de la plaque engluée.

Placer la coupelle verte au milieu la plaque engluée. Vider le contenu de la seringue par simple pression sur le piston (inutile de découper l'embout) dans la coupelle.

Insérer la plaque dans le piège avant de le refermer.

Consultez notre catalogue complet

M2i Biocontrol, 112 bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud cedex RCS Nanterre 801069428 - N° Certiphyto : 9200007 - contact@m2i-biocontrol.com - www.m2i-group.fr