Sesamia Pro Caps®



Trapping solution based on pheromone against *Sesamia nonagrioides*

This solution combines a Delta trap and a pheromone attractant dispenser to capture the male adults of the corn stalk borer males .

Benefits

- Long diffusion time
- Formulated with bio-based ingredients
- Usable in organic farming
- Easy to apply
- Decision support tool
- Species-specific targeting
- Storage at room temperature (0-30°C)

Characteristics of Sesamia Pro Caps ®

Product type	Phermone dispenser
Packaging	Polypropylene syringue
Use	Detection / Monitoring
Active substance	(Z)-11-hexadecenyl-acetate; (Z)-11-hexadecenol
Target	Corn stalk borer (*Sesamia nonagriodes*)
Volume of formulation	0,45 g
Indicative diffusion time*	3 months
Estimated diffusion radius	Moths attracted on a radius of approximatively 5 m

** at an average temperature of 30 °C and without strong wind.*

Use

- **Detection period :** From May to September (remember to renew Pheromone dispenser according to the indicative duration of diffusion). Adapt according to local pest cycle and biology.
- **Trap location :** Suspended about 1.5 m from the ground..
- **Recommended density for monitoring :** 2-5 traps/ha
- Consult your reference agronomist for more details




Associated traps





Trap setup

Example of use of an **Sesamia Pro Caps ®** + Delta trap



Mount the Delta Trap

Remove the protective film from the glue plate

Place the green cup in the middle of the plate and empty the syringe contents into the cup by simply pressing the plunger (no need to cut the tip).

Insert the plate into the trap before closing it

Check out our full catalog

M2i Biocontrol, 112 bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud cedex RCS Nanterre 801069428 - N° Certiphyto : 9200007 - contact@m2i-biocontrol.com - www.m2i-group.fr

Sesamia Pro Caps®



Solution de piégeage à base de phéromones contre *Sesamia nonagriodes*

Cette solution combine un piège Delta et un diffuseur à base de phéromone pour capturer les mâles adultes de la sésamie du maïs.

Avantages

- Diffusion longue durée
- Formulé avec des ingrédients biosourcés
- Utilisable en agriculture biologique
- Facile à appliquer
- Outil d'aide à la décision
- Spécifique au ravageur ciblé
- Stockage à température ambiante (0-30°C)

Caractéristiques de Sesamia Pro Caps®

Type de produit	Diffuseur de phéromones
Conditionnement	seringue en propylène
Usage	Détection / Monitoring
Substance active	(Z)-11-hexadecenyl-acetate; (Z)-11-hexadecenol
Cible	Sésamie du maïs (*Sesamia nonagriodes*)
Volume de formulation	0,45 g
Durée indicative de diffusion*	3 mois
Rayon estimé de diffusion	Papillons attirés sur un rayon d'environ de 5 m

** pour une température moyenne de 30 °C et sans vent fort.*

Utilisation

- **Période de détection :** du Mai à Septembre (adapter et renouveler le diffuseur de phéromones en fonction du temps de diffusion recommandé)
- **Positionnement du piège :** suspendu à environ 1,5 m au-dessus de la culture.
- **Densité recommandée pour le monitoring :** 2 à 5 pièges/ha
- Consultez votre agronome de référence pour plus de détails.




Pièges associés





Montage de piège

Exemple d'utilisation de **Sesamia Pro Caps®** + Delta trap



Montez le piège Delta

Retirer le film protecteur de la plaque engluée.

Placer la coupelle verte au milieu la plaque engluée. Vider le contenu de la seringue par simple pression sur le piston (inutile de découper l'embout) dans la coupelle.

Insérer la plaque dans le piège avant de le refermer.

Consulter notre catalogue complet

M2i Biocontrol, 112 bureaux de la colline - 92210 Saint-Cloud cedex RCS Nanterre 801069428 - N° Certiphyto : 9200007 - contact@m2i-biocontrol.com - www.m2i-group.fr